

1962 n° 25-27 à jour

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

21 MARS 1962

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST (Tél. Arras 23-14)

(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux.

C. C. P. : ULLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

- n° XXV -

Octobre 1962

INFORMATIONS

- CHANCER DU POMMIER -

CULTURES FRUITIÈRES

Cette maladie est une des plus graves dans nos vergers. Il n'existe pas actuellement de méthode de lutte radicale contre ce champignon mais l'observation d'un certain nombre de précautions permet de limiter son extension.

1) Mesures éradicantes

- Elimination des vieux arbres non entretenus au voisinage des vergers.
- surveillance sévère des jeunes vergers la première année et destruction systématique des rameaux voire des arbres entiers contaminés.
- surveillance continue des plantations, destruction des rameaux atteints, curetage et masticage des chancres sur les gros rameaux ou les troncs. (Si possible, ces opérations doivent être terminées avant l'automne pour éviter les fructifications sur les vieux chancres).

2) Mesures préventives

- Plantation de jeunes sujets reconnus sains. Le champignon pénétrant surtout par les blessures de l'écorce, celles-ci doivent être protégées en particulier au moment des fortes contaminations qui ont surtout lieu au printemps et à l'automne. Pour ce faire, il convient :
 - d'une part, de recouvrir les plaies accidentelles ou les plaies de taille à l'aide d'un mastic antichancres du commerce.
 - d'autre part, d'effectuer des traitements cupriques à la dose de 500 grs de cuivre par hectolitre à la chute des feuilles et au débourrement.
- A la chute des feuilles, il est préférable dans les vergers très sensibles, d'effectuer deux traitements à forte pression (pour essayer de faire tomber les feuilles sous le jet du pulvérisateur), le premier dès le début de la chute des feuilles, le second avant la chute totale.

Enfin, toutes les mesures renforçant la bonne santé des arbres et l'assainissement du verger sont évidemment à observer.

ARBRES FRUITIERS A NOYAUX : Effectuer un traitement cuprique à la chute des feuilles.

- GROSSE ALTISE DU COLZA -

GRANDES CULTURES

Le temps froid ne favorise guère ce ravageur. Surveiller cependant les cultures.

- DESINFECTION DES SEMENCES DE CEREALES -

C'est une opération indispensable qui est souvent effectuée par les organismes qui commercialisent les grains. Le rôle du producteur est alors de s'assurer que ce traitement a été fait et que les produits utilisés correspondent à ses besoins.

Sinon, il pourra recourir au poudrage qui est la technique d'emploi la plus facile.

Les produits employés sont de 3 types :

- Fongicides contre les maladies
- Insecticides, principalement contre les Taupins
- Répulsifs anti-corbeaux.

Consulter l'Index Phytosanitaire pour avoir les caractéristiques des différentes spécialités du commerce.

Le Contrôleur : R. DIVOIX

IMPRIMERIE DE LA STATION DU NORD-OUEST, DIRECTEUR GÉRANT : L. BOUYX

L'Inspecteur : P. COUTURIER

40 Jo. 15330